

Rekommendationer för användning av antigen test (snabbtest) för covid-19 i verksamheter utanför hälso- och sjukvården till exempel på arbetsplatser eller inom idrottsverksamheter

Screening med antigen test där nära kontakter mellan människor inte kan undvikas *kan* vara en tilläggsåtgärd för att tidigt upptäcka smitta och begränsa utbrott.

Antigen test *kan inte* användas för att sluta följa råd och rekommendationer eller för att låta personer med symptom bryta sin isolering.

Vad gäller för aktörer utanför vård och omsorg som erbjuder screening med antigen testning/snabbtest för covid-19?

- Bedöm om nyttan av antigen test i den aktuella situationen är rimlig i förhållande till kostnaderna. Viktiga faktorer är aktuellt smittläge, andel vaccinerade och verksamhetens känslighet. Den verksamhet som inför antigen test ska själv stå för kostnaden.
- Använd ett antigen test som uppfyller folkhälsomyndighetens krav¹ och som är CE-märkt (eller IVD-märkt med dispens av läkemedelsverket för användning som självtest)². Om de testade ska prova sig själva utan hjälp av sjukvårdspersonal krävs ett test som är anpassat för provtagning i näsa.
- Välj testfrekvens och utförare. Vid regelbunden testning bör helst minst två tester per vecka och individ utföras. Testen bör göras precis innan eller i början av ett arbetspass. All testning ska vara frivillig.
- Antigen test har en lägre känslighet jämfört med PCR-test och ska **inte** användas om personen har symptom som kan tala för covid-19. Vid symptom beställ istället PCR-test via 1177.se.
- Se till att de som ska utföra testen förstår hur de ska göra. Felaktiga resultat på grund av missförstånd är vanliga när man är ovan. Alla som ska utföra testen måste läsa igenom hela instruktionen innan denne påbörjar testen. Instruktionsfilmer kan vara till stor hjälp.
- Ge tydliga instruktioner om vad som ska göras vid positivt eller negativt resultat (se nästa sida).
- Vid flera fall inom en verksamhet ska smittspårning inklusive provtagning göras i samråd med Smittspårningsenheten.

Läs mer på:

- 1) [Vägledning för användning av antigen test vid covid-19 \(folkhälsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-oss/utbildning-och-utveckling/utbildning-och-utveckling-2020-2021/antigen-testning-och-snabbtest-for-covid-19)
- 2) [Självtester för covid-19 | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency \(lakemedelsverket.se\)](https://lakemedelsverket.se/om-lakemedelsverket/produkter-och-tjanster/sjvalvtester-for-covid-19)

Till dig med positivt resultat:

- Meddela arbetsledare eller annan överenskommen person.
- Gå hem och påbörja isolering i hemmet. Även de du bor tillsammans med bör stanna hemma och inte träffa någon.
- Logga omgående in på 1177.se och boka tid till självprovtagning covid-19. Ett antigen test (snabbtest) är inte tillräckligt säkert. Du måste få provresultatet bekräftat av en vanlig provtagning (PCR).
- Med ett genomfört PCR-test får du också en ansvarig läkare som kan informera, dokumentera, smittspåra och anmäla till smittskyddsläkaren. Ett dokumenterat positivt test i patientjournalen krävs för att du senare ska kunna visa att du har haft covid-19. Det behövs också om de du bor tillsammans med ska kunna ansöka om smittbärrpenning.

Till dig med negativt resultat:

- Tänk på att ett negativt resultat inte helt utesluter att du bär på viruset. Testen upptäcker inte alla fall. I vissa undersökningar får så många som hälften av dem med låga virusnivåer falskt negativa provresultat vid användning av antigen test. Du kan också ha blivit smittad men ännu inte börjat producera virus (inkubationsfas).
- Fortsätt följa råd och rekommendationer.
- Om du har symptom som kan tala för covid-19 måste du också beställa provtagning med PCR via 1177.se och stanna hemma i väntan på svar. Detta gäller även om antigen testet är negativt.

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2021-05-31	Justering i rekommendationerna.	Andreas Delphin