

Vaccinerande sjuksköterskor inom Region Kalmar län, inkl privata enheter inom Hälsoval

Vaccinerande sjuksköterskor i Kalmar läns kommuner

Ordination enligt generellt direktiv gällande vaccin mot covid-19

Gäller för _____

(Enhetens namn, inkl kommunens sjuksköterskor inom området)

Vaccin

Spikevax (tidigare COVID-19 Vaccine Moderna)

Dos

0,5 ml som intramuskulär injektion. Minst 4 veckor mellan dos 1 och dos 2.

Som tredje påfyllnadsdos ges 0,25 ml, undantaget kraftigt immunsupprimerade som omfattas av särskild rekommendation. Minst 6 månader mellan dos 2 och dos 3.

Detta vaccin är inte godkänt för subkutan administrering.

Indikation

Vaccination mot covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens vid var tid gällande rekommendationer. Spikevax rekommenderas för personer födda 1990 och tidigare. Personer födda 1991 och senare som fått en dos ska avvakta med dos 2 tills vidare.

Spikevax kan ges som tredje dos enligt ovan oaktat vilka vacciner patienten fått som första och andra dos.

Att administrera läkemedel enligt generellt direktiv innebär att sjuksköterska först gjort en bedömning av patientens behov av läkemedlet, samt beaktat indikation, kontraindikation(er) och observanda.

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot någon av vaccinets beståndsdelar. Vid tidigare äkta anafylaktisk reaktion (oavsett agens) eller annan allvarlig reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel kontaktas enhetens läkare som bedömer nyttan med vaccinationen jämfört med risken.

Observanda

- Vid högaktiv autoimmun sjukdom eller instabil immunsuppression bör beslut om vaccination endast tas av patientansvarig läkare. Behandlingen kan behöva förskjutas i förhållande till vaccinationen.
- Vaccination ska senareläggas hos individer med akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion. Förekomst av lindrig infektion och/eller lågradig feber utgör inte skäl för att senarelägga vaccination.

Dokumentation

Dokumentation sker enligt separat rutin. Registrering ska göras inom 24 timmar, och är av stor vikt för rapportering till det nationella vaccinationsregistret.

Patienter med blodförtunnande läkemedel

Se Läkemedelskommitténs riktlinje (Bilaga 2). Sammanfattning:

Rekommendation för vaccination med något vaccin mot COVID-19 om patienten har pågående behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare.


Vaccinet kan ges:

- Vid behandling med enbart ett "blodförtunnande läkemedel" (även warfarin om $PK < 3,0^*$)
- Vid kombination av två "blodförtunnande" läkemedel
 - a) warfarin (om $PK < 3,0^*$) eller DOAK, plus en trombocythämmare
 - b) två olika trombocythämmare, t ex klopidogrel plus acetylsalicylsyra
- Vid "trippelbehandling" (warfarin eller DOAK, plus två olika trombocythämmare): Vänta helst med vaccination tills trippelbehandlingen upphör. Om det inte är möjligt, se till att PK-värdet är dagsaktuellt ($PK < 1,8$)! Ta gärna kontakt med AK-mottagning för hjälp med dosjustering.

För ALLA patienter med antikoagulantia-behandling: KOMPRIMERA i 10 minuter och låt patienten stanna kvar på lämplig plats. Observera stickstället före hemgång.

* Kommentarer och observanda:

- a) Aktuellt PK-värde ska inte vara äldre än en vecka. Meddela AK-mottagningen om warfarin-dosen minskas inför vaccination!
- b) För DOAK och lågmolekylärt heparin: Om möjligt, ge vaccinet i slutet av ett intervall mellan två dostillfällen. Då är koncentrationen (och antikoagulationseffekten) som lägst ("dalvärde").


Arsene Nzobandora,
bitr Smittskyddsläkare

Basenhetschef

Medicinskt Ledningsansvarig läkare

Bilagor

Bilaga 1 Riktlinje Vaccination mot covid-19

Bilaga 2 Riktlinje för covid-19-vaccination vid antikoagulantia-behandling