

Vaccinerande sjuksköterskor inom Region Kalmar län
Vaccinerande sjuksköterskor i Kalmar läns kommuner

Ordination enligt generellt direktiv gällande vaccin mot covid-19

Gäller för _____

(Enhetens namn, inkl kommunens sjuksköterskor inom området)

Vaccin

Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca)

Dos

0,5 ml som intramuskulär injektion. Minst 4 veckor mellan dos 1 och dos 2. Detta vaccin är inte godkänt för subkutan administrering.

Indikation

Vaccination mot covid-19. Vaccination rekommenderas till vuxna, inte till barn i nuläget. Att administrera läkemedel enligt generellt direktiv innebär att sjuksköterska först gjort en bedömning av patientens behov av läkemedlet, samt beaktat indikation, kontraindikation(er) och observanda.

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot någon av vaccinets beståndsdelar. Vid tidigare äkta anafylaktisk reaktion (oavsett agens) eller annan allvarlig reaktion mot vaccin eller annat injicerat läkemedel kontaktas enhetens läkare som bedömer nyttan med vaccinationen jämfört med risken.

Observanda

- Vid högaktiv autoimmun sjukdom eller instabil immunsuppression bör beslut om vaccination endast tas av patientansvarig läkare. Behandlingen kan behöva förskjutas i förhållande till vaccinationen.
- Vaccination ska senareläggas hos individer med akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion. Förekomst av lindrig infektion och/eller låggradig feber utgör inte skäl för att senarelägga vaccination.
- Gravida rekommenderas inte vaccination utifrån nuvarande kunskapsläge. Individuell läkarbedömning krävs. (Vaccination är inte kontraindicerad för ammande.)

Dokumentation

Dokumentation sker enligt separat rutin. Registrering ska göras inom 24 timmar, och är av stor vikt för rapportering till det nationella vaccinationsregistret.

Patienter med blodförtunnande läkemedel

Se Läkemedelskommitténs riktlinje (Bilaga 2). Sammanfattning:

Rekommendation för vaccination med något vaccin mot COVID-19 om patienten har pågående behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare.

Vaccinet kan ges:

- Vid behandling med enbart ett "blodförtunnande läkemedel" (även warfarin om $PK < 3,0^*$)
- Vid kombination av två "blodförtunnande" läkemedel
 - a) warfarin (om $PK < 3,0^*$) eller DOAK, **plus en** trombocythämmare
 - b) två olika trombocythämmare, t ex klopidogrel **plus** acetylsalicylsyra
- Vid "trippelbehandling" (warfarin eller DOAK, **plus två** olika trombocythämmare): Vänta helst med vaccination tills trippelbehandlingen upphör. Om det inte är möjligt, se till att PK-värdet är dagsaktuellt ($PK < 1,8$)! Ta gärna kontakt med AK-mottagning för hjälp med dosjustering.

För ALLA patienter med antikoagulantia-behandling: KOMPRIMERA i 10 minuter och låt patienten stanna kvar på lämplig plats. Observera stickstället före hemgång.

* Kommentarer och observanda:

- a) Aktuellt PK-värde ska inte vara äldre än en vecka. Meddela AK-mottagningen om warfarin-dosen minskas inför vaccination!
- b) För DOAK och lågmolekylärt heparin: Om möjligt, ge vaccinet i slutet av ett intervall mellan två dostillfällen. Då är koncentrationen (och antikoagulationseffekten) som lägst ("dalvärde").



Lisa Labbé Sandelin
Smittskyddsläkare

Basenhetschef

Medicinskt Ledningsansvarig läkare

Bilagor

- Bilaga 1 Riktlinje Vaccination mot covid-19
Bilaga 2 Riktlinje för covid-19-vaccination vid antikoagulantia-behandling